

# Biopsia guiada por ecografía asistida por vacío

---

## Instrucciones previas a la biopsia:

- Antes de la biopsia con aguja, debe informarle al médico si tiene alergias, especialmente a los anestésicos locales como la lidocaína.
- Llegue 30 minutos antes de la cita programada para registrarse y para realizar cualquier copago según lo requiera su compañía de seguros.
- No hay restricciones dietéticas para el día de la biopsia. Puede comer un desayuno o almuerzo liviano antes del procedimiento.
- Si usted maneja habitualmente, la mayoría de los pacientes se sienten cómodos manejando de regreso a su casa luego del procedimiento. Si lo prefiere, puede pedirle a alguna persona que lo lleve de regreso a su casa.
- No tome aspirina, antiinflamatorios (Ibuprofen, Advil, Aleve, etc.), coumadin ni cualquier otro anticoagulante durante los 5 días previos a la biopsia. Si toma Plavix, un medicamento anticoagulante, deberá dejar de tomarlo durante los 10 días previos a la biopsia. Si su médico le recetó alguno de estos medicamentos, deberá obtener la aprobación de su médico antes de suspenderlos.
- Excepto por los medicamentos anticoagulantes, deberá continuar tomando todos los otros medicamentos que tome habitualmente, incluidos los medicamentos para la presión arterial, la diabetes, el colesterol, la tiroides, etc.
- Use una camiseta suelta para dejar espacio para una compresa fría y un vendaje ACE que se colocará sobre la zona donde se realice la biopsia después del procedimiento.

## Procedimiento de la biopsia guiada por ecografía asistida por vacío:

- Deberá recostarse boca arriba sobre la camilla de examen o girado levemente sobre un costado.
- El técnico realizará otra ecografía para encontrar la zona afectada.
- Se le inyectará anestesia local en la mama (lidocaína). Sentirá un pinchazo leve de la aguja. Indíquele al personal si necesita más anestesia.
- Se realizará una pequeña incisión en la piel, en la zona donde se insertará la aguja para la biopsia.
- El radiólogo, quien supervisará la lesión constantemente con la sonda ecográfica, insertará la aguja y la conducirá hasta la zona afectada.
- Escuchará sonidos que provienen del dispositivo para realizar la biopsia.
- Luego, se extirpan muestras de tejido mediante succión.
- Se puede colocar un marcador pequeño en la zona para que pueda ubicarse en el futuro si fuera necesario.
- Una vez que se complete la biopsia, se aplicará presión durante, aproximadamente, 10 minutos para detener el sangrado.
- La incisión en la piel se cubrirá con un pedacito de cinta quirúrgica (Steri-Strip) y un vendaje de gasa. No es necesario suturar.
- Es posible que se realice una mamografía para documentar la zona de la biopsia.
- Permanecerá despierto durante el procedimiento.

---

## Instrucciones posteriores a la biopsia:

- Se le entregarán instrucciones escritas después del procedimiento.
- Es posible que aparezca un hematoma o que tenga sensibilidad al tacto luego de la biopsia. Los medicamentos anticoagulantes indicados anteriormente no deben tomarse durante las 24 horas posteriores al procedimiento para evitar riesgos de complicaciones.
- Debe evitar levantar objetos pesados (10 libras o más) y las actividades vigorosas durante 24 horas luego del procedimiento.
- Utilice una bolsa con hielo sobre la zona durante varias horas (coloque 30 minutos y quítela durante 30 minutos). Coloque la bolsa con hielo en el congelador cuando no la utilice. Utilice el vendaje ACE provisto para minimizar el movimiento de las mamas durante 12 a 24 horas, según le indiquen.
- Mantenga la zona de la biopsia seca durante 48 horas. Puede bañarse luego de las 48 horas, pero no sumerja la zona de la biopsia hasta que se haya caído la cinta quirúrgica. Por lo general, esto ocurre en 5 o 6 días.
- Si lo desea, puede utilizar un antibiótico de uso tópico en la zona donde se realizó la biopsia.
- Recibirá los resultados de la biopsia en un plazo de 10 días. Si no recibe los resultados en ese plazo, comuníquese con su médico.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o comienza a tener algún problema grave, comuníquese con su médico. Además, puede comunicarse con el Centro de Contacto Kelsey-Seybold al 713-442-0000, que se encuentra disponible las 24 horas del día.